

Buctril® universal

- Nuevo herbicida de post-emergencia para cereales.
- De absorción foliar, con acción sistémica y de contacto.
- Útil para una estrategia anti-resistencias por sus dos diferentes modos de acción.
- Amplio espectro de acción sobre las principales malas hierbas de hoja ancha.
- Controla amapola resistente.
- Excelente complemento herbicida en alternancia y en mezclas (*).

(*) Se recomienda consultar previamente a nuestro servicio técnico



Science For A Better Life

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C/ Charles R. Darwin, 13
46980 Paterna (Valencia)
Teléfono 96 196 53 00

www.cropscience.bayer.es

Antes de utilizar el producto
léase detenidamente la etiqueta

La **pieza** que faltaba en el puzle



Buctril® universal

Nuevo herbicida de
post-emergencia para el
control de malas hierbas
dicotiledóneas en cereales

Buctril® universal

Buctril® Universal es un herbicida post-emergente compuesto por dos sustancias activas con distintos modos de acción (2,4 D y bromoxinil), que se absorbe a través de las hojas y actúa sobre las malas hierbas por contacto y de forma sistémica.

- Favorece la producción por su amplio control de malas hierbas
- Se puede aplicar en mezcla
- Eficaz contra amapola resistente
- Rápida absorción
- Seguro y cómodo



Ficha de producto

Composición:
2,4D ácido 280 g/L + bromoxinil 280 g/L

N° Registro:
25.742

Formulación:
EC (Concentrado emulsionable)

Envase:
5 L

Malas hierbas controladas



Sinapis arvensis



Centaurea cyanus



Papaver spp



Cirsium arvense

Amaranthus retroflexus
Capsella bursa-pastoris
Calystegia sepium
Centaurea cyanus
Chenopodium album
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Equisetum arvense
Matricaria chamomilla
Papaver spp
Picris echioides
Polygonum aviculare
Ranunculus arvensis
Raphanus raphanistrum
Rapistrum rugosum
Sinapis arvensis
Solanum nigrum
Sonchus spp
Stellaria media
Thlaspi arvense
Veronica spp
Xanthium spp
Vicia spp

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Trigo blando y duro, cebada, centeno	1 L/ha	Aplicar con el cereal entre inicio de ahijado y segundo nudo
Maíz, sorgo	0,8 L/ha	Aplicar entre 3 y 6 hojas del cultivo