

Hoja informativa

Cerco

Herbicida selectivo.

Composición: Bentazona 48% p/v (480 g/l)

Formulación: Concentrado Soluble

Envases: 1 litro · 5 litros

Nº Registro: 11.317

CARACTERÍSTICAS

Herbicida selectivo para combatir las malas hierbas de hoja ancha (dicotiledóneas). Para conseguir una máxima eficacia es aconsejable mojar abundantemente con el caldo de pulverización las hojas y el tallo de las malas hierbas.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Aplicar en pulverización normal con tractor. Arroz: se utilizará la dosis más alta para el control de *Scirpus sp.* Cebada, centeno y trigo: en variedades de ciclo corto no sobrepasar la dosis de 1,5 l/ha. Son resistentes entre los más comunes: *Papaver sp.* (amapola), *Polygonum aviculare* (cien nudos), *Taraxacum officinale* (diente de león) y los géneros *Veronica sp.* y *Cirsium sp.*

ÉPOCA DE EMPLEO

Alfalfa, soja y trébol: Aplicar entre la 1ª y 3ª hoja trifoliada.

Guisantes y judías para grano: aplicar a partir de la 4ª hoja.

Patata: Con el cultivo en postemergencia hasta la 4ª hoja. Maíz: En postemergencia cuando tenga al menos 10 cm. de altura. Cebada, centeno y trigo: en postemergencia desde el estado de 3 hojas hasta el encañado.

Arroz: aplicar en postemergencia o post-trasplante, 20 días después del trasplante o de 5 a 6 semanas después de la siembra, cuando el cultivo se encuentra ahijado, bajando el agua antes de la aplicación hasta 2-3 cm., y no se volverá a restablecer el nivel primitivo hasta 2-3 días después de la aplicación. Es aconsejable que las malas hierbas tengan de 3 a 5 hojas y que no sobresalgan del nivel de agua, caso de que exista una cierta cantidad de ésta en el terreno.

**APLICACIONES
AUTORIZADAS**

**PLAZOS DE
SEGURIDAD (DÍAS)**

**MALAS
HIERBAS**

DOSIS

| | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------|
| Alfalfa | n.p. | Dicotiledóneas | 1,5-2 l/ha |
| Arroz | n.p. | Dicotiledóneas | 2 l/ha |
| Cebada | n.p. | Dicotiledóneas | 2 l/ha |
| Centeno | n.p. | Dicotiledóneas | 2 l/ha |
| Guisantes para grano | n.p. | Dicotiledóneas | 1,5-2 l/ha |
| Judías para grano | n.p. | Dicotiledóneas | 1,5-2 l/ha |
| Maíz | n.p. | Dicotiledóneas | 2 l/ha |
| Patata | n.p. | Dicotiledóneas | 2 l/ha |
| Soja | n.p. | Dicotiledóneas | 1,5-2 l/ha |
| Trébol | n.p. | Dicotiledóneas | 1,5-2 l/ha |
| Trigo | n.p. | Dicotiledóneas | 2 l/ha |

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Evitar su liberación al medio ambiente.

Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Para proteger las plantas no objeto de tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m de distancia mínima hasta la zona no cultivada.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

MSDS Cerco 2015 (Hoja de seguridad)