

Nemacur® 40 LE

NEMATICIDA SISTÉMICO PARA EL CONTROL DE TODO TIPO DE NEMÁTODOS

Nematicida que tiene acción sistémica. Aplicado en el suelo, es absorbido por las raíces de las plantas y mata los nemátodos, tanto de vida ectoparasitaria como endoparasitaria: *Meloidogyne* sp (formadores de agallas), *Heterodera* sp (formadores de quistes), *Pratylenchus* sp, *Tylenchulus* sp y otros nemátodos del suelo, nemátodos de hojas, etc.

Posee buena compatibilidad con todos los cultivos en los que está autorizado su empleo.

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS DE EMPLEO

Aplicar mediante riego por goteo, solo en invernaderos con estructura permanente.

Platanera: Contra nematodos y picudo, dosificar a razón de 25 l/ha. Efectuar como máximo 2 aplicaciones por campaña, la 1ª en primavera y la 2ª en otoño, respetándose el plazo de seguridad.

Ornamentales herbáceas: Contra nematodos dosificar a razón de 12-25 l/ha.

Calabacín, melón, pepino, pimiento, sandía y

tomate: Contra nematodos, dosificar a razón de 12-25

l/ha, se pueden realizar dos aplicaciones por campaña, fraccionando la dosis a la mitad, si la duración del cultivo permite respetar el plazo de seguridad, dando la 1ª aplicación antes de la siembra o trasplante, en el momento o inmediatamente después y la 2ª durante el período de enraizamiento del cultivo, antes del inicio de la floración.

Vid de mesa: Contra nematodos, dosificar a razón de 25-50 l/ha.

Composición	Fenamifos 40% p/v (400 g/l)
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
R.O.P.M.F. n°	12.054
Envasado	5 Litros, 20 Litros
Clasificación	Tóxico (T), Peligroso para el Medio Ambiente (N) Mamíferos: C Aves: C Peces: C

FORMA DE EMPLEO

Las dosis anteriores están referidas al tratamiento de toda la superficie del suelo, debiéndose aplicar mediante riego por goteo.

PLAZO DE SEGURIDAD

Platanera: 15 días.

Calabacín, melón, pepino, pimiento, sandía y tomate: 60 días.

Vid de mesa: 90 días.

Ornamentales herbáceas: no procede.